



BRAVECTO®

Der 12 Wochen*- Parasitenschutz für Ihren Hund

Produktinformationen
von Ihrem Tierarzt


MEHR. WERT.
PRÄVENTION.



MSD

Tiergesundheit

FAKTEN ZUR ZECKE



Häufigste Zeckenarten in Deutschland & Österreich:

Gemeiner Holzbock (*I. ricinus*)

Wiesenzecke (*D. reticulatus*)



Tierbesitzer haben ein **1,5-fach höheres Risiko** für einen Zeckenstich als Menschen ohne Tier.

Zecken können **Krankheitserreger** wie Babesien und Borrelien übertragen.

In Europa sind bis zu **75 %** der *I. ricinus*-Zecken mit Borrelien infiziert.¹

Zeckenstiche und nicht sachgerecht entfernte Zecken können **entzündliche Reaktionen** auslösen.

FAKTEN ZUM FLOH

Nur **5 %** sind sichtbar! **95 % leben „unbemerkt“** bei Ihnen Zuhause (z. B. unter Teppichen, in der Bettwäsche oder im Körbchen Ihres Tiers).

Der Floh dient als Zwischenwirt von Bandwürmern, z. B. **Gurkenkernbandwurm**.

Die häufigsten Symptome eines Flohbefalls: **Juckreiz und Haarausfall**.

Flöhe können unter anderem die **Krankheitserreger** von bakteriellen Infektionen (z. B. Staphylokokken) übertragen.

Achtung, wenn Ihr Hund **allergisch auf den Flohspeichel** (Flohallergiedermatitis, FAD) reagiert! Das zeigt sich u. a. durch starken Juckreiz, eitrige Hautentzündungen oder Haarausfall.

50 %
Eier

Sichtbarkeit
Flöhe

5 %
Erwachsene Flöhe

10 %
Nymphen

35 %
Larven

Weitere Parasiten, die beim Hund vorkommen können, sind:



Demodex Milben

Nisten sich in Haarfollikeln & Talgdrüsen ein. Ein Befall zeigt sich in Form von Hautrötungen, Haarausfall, Krusten und Infektionen.



Sarcoptes Milben (Räude)


Sind sehr winzig und graben sich in die Haut ein. Ein Befall zeigt sich in Form von Hautirritationen, Haarausfall und starkem Juckreiz.

WARUM BRAUCHT ES EINEN LÜCKENLOSEN & GANZJÄHRIGEN SCHUTZ?



Die zunehmenden klimatischen Veränderungen begünstigen das Vorkommen und eine stärkere Verbreitung von **Zecken**.

Haben sich **Flöhe** einmal bei Ihnen Zuhause eingenistet, sind sie nur schwer wieder loszuwerden.



Adaptiert nach L. Chitimia-Dobler, G. Dobler, Nationales Konsiliarlabor für FSME Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr München, Vortrag „Zecken“, Pressekonferenz MSD Tiergesundheit, Bielefeld, 2019.

Die ESCCAP[#] empfiehlt:

„In Gebieten, in denen infizierte Zecken vorkommen, besteht das Risiko, dass Tiere sich mit Erregern zeckenübertragener Erkrankungen anstecken. Daher werden kontinuierliche Behandlungen mit dem Ziel einer konstanten Schutzwirkung empfohlen.“^{#2}

„Eine sachgerechte Flohbekämpfung hat zum Ziel, einen Flohbefall bei Haustieren zu verhindern. (...) Ist die Wahrscheinlichkeit für eine Reinfestation hoch, empfiehlt sich eine regelmäßige, eventuell ganzjährige Prophylaxe durch Anwendung geeigneter Tierarzneimittel. Auch wenn der Flohbefall im Sommer und Herbst am häufigsten auftritt, haben Studien gezeigt, dass eine Infestation mit Flöhen in jeder Jahreszeit möglich ist.“^{#2}

Ein lückenloser & ganzjähriger Schutz vor Zecken und Flöhen ist ratsam.



[#] Die European Scientific Counsel Companion Animal Parasites (ESCCAP) stellt regelmäßig aktualisierte, fundierte Informationen zur Verfügung, die helfen, Hunde und Katzen – aber auch Menschen – vor einem Befall mit Parasiten und dessen Folgen zu schützen.

BRAVECTO®:

SOFORTIGE UND ANHALTENDE WIRKUNG*



Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls

Wirkeintritt bei Flöhen (*C. felis*) innerhalb von 8 Stunden, bei Zecken (*I. ricinus*) innerhalb von 12 Stunden. Wirkt 12 Wochen* lang.



Reduziertes Infektionsrisiko über 12 Wochen

Reduziertes Infektionsrisiko der von der Wiesenzecke (*D. reticulatus*) übertragenen Blutparasiten *Babesia canis* mit der BRAVECTO® Kautablette



Anwendbar bei Hundewelpen ab 8 Wochen und ab 2 kg Körpergewicht



Zugelassen auch bei trächtigen & säugenden Hündinnen



Zuchthunde



Hunde mit Flohallergiedermatitis (FAD)



Anwendung auch bei Hunden mit MDR1-Defekt



BRAVECTO® ZUR BEHANDLUNG VON



Zecken*



Flöhen*



Demodex Milben



Sarcoptes Milben
(Räude)



Unser Erinnerungsservice unterstützt Sie dabei,
an den nächsten Parasitenschutz zu denken:
www.bravecto.de/erinnerungsservice

VERWENDEN SIE BRAVECTO® GEMÄSS DER GEWICHTSKLASSE IHRES HUNDES

Kautablette und Spot-on sind als 1er- und 2er-Packungen erhältlich

BRAVECTO® Kautablette



BRAVECTO® Spot-on



Weitere Informationen, auch zur Anwendung, finden Sie in der Gebrauchsinformation.

INFORMATIONEN VON IHRER TIERARZTPRAXIS

Überreicht durch:

Für weitere Informationen zu verschiedenen Hundethemen: www.lieblingstier.info

Referenzen: 1. Rauter C, Hartung T. Prevalence of *Borrelia burgdorferi* sensu lato genospecies in *Ixodes ricinus* ticks in Europe: a meta-analysis. Appl Environ Microbiol. 2005;71(11):7203–16. 2. <https://www.esccap.de/tieraerzte/empfehlungen/ektoparasiten>

* **Bravecto® Kautabletten:** sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (*Ctenocephalides felis*) über 12 Wochen, sofortige und anhaltende Zecken-abtötende Wirkung gegen *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus* und *D. variabilis* über 12 Wochen sowie eine sofortige und anhaltende Zecken-abtötende Wirkung gegen *Rhipicephalus sanguineus* über 8 Wochen. Zur Behandlung der durch *Demodex canis* verursachten Demodikose. Zur Behandlung eines *Sarcoptes*-Räude (*Sarcoptes scabiei* var. *canis*) Befalls. **Bravecto® Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde:** sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (*Ctenocephalides felis* und *Ctenocephalides canis*) über 12 Wochen, sofortige und anhaltende Zecken-abtötende Wirkung (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus* und *Dermacentor reticulatus*) über 12 Wochen. Zur Behandlung der durch *Demodex canis* verursachten Demodikose. Zur Behandlung eines *Sarcoptes*-Räude (*Sarcoptes scabiei* var. *canis*) Befalls.

Bravecto® 112,5/250/500/1000/1400 mg Kautabletten für sehr kleine/kleine/mittelgroße/große/sehr große Hunde. **Wirkstoff:** Fluralaner. **Wirkstoffgruppe:** Ektoparasitika zur systemischen Anwendung. **Zusammensetzung:** 1 Kautablette enthält: 112,5/250/500/1000/1400 mg Fluralaner. Sonstige Bestandteile: Schweineleberaroma, Sucrose, Maisstärke, Natriumdodecylsulfat, Dinatriumembonat-Monohydrat, Magnesiumstearat, Aspartam, Glycerol, Sojabohnenöl, Macrogl 3350. **Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls bei Hunden. Dieses Tierarzneimittel ist ein systemisches Insektizid und Akarizid und bietet eine sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (*Ctenocephalides felis*) über 12 Wochen, sofortige und anhaltende Zecken-abtötende Wirkung gegen *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus* und *D. variabilis* über 12 Wochen sowie eine sofortige und anhaltende Zecken-abtötende Wirkung gegen *Rhipicephalus sanguineus* über 8 Wochen. Flöhe und Zecken müssen am Wirt anheften und mit der Nahrungsaufnahme beginnen, um dem Wirkstoff ausgesetzt zu werden. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt werden. Zur Behandlung der durch *Demodex canis* verursachten Demodikose. Zur Behandlung einer *Sarcoptes*-Räude (*Sarcoptes scabiei* var. *canis*). Zur Verringerung des Infektionsrisikos mit *Babesia canis* mittels Übertragung durch *Dermacentor reticulatus* für bis zu 12 Wochen. Die Wirkung erfolgt indirekt durch die Aktivität des Produkts gegen den Vektor. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Milde und vorübergehende gastrointestinale Symptome wie Durchfall, Erbrechen, Appetitlosigkeit und vermehrter Speichelfluss wurden häufig in klinischen Studien beobachtet (bei 1,6 % der behandelten Hunde). In sehr seltenen Fällen wurde in Spontanmeldungen von Krämpfen und Lethargie berichtet. Lethargie, Muskelzittern, Ataxie und Krämpfe wurden in sehr seltenen Fällen in Spontanmeldungen berichtet. Die meisten berichteten Nebenwirkungen waren vorübergehend und von kurzer Dauer. **Handelsformen:** Faltschachtel mit 1 oder 2 Kautabletten im Blistert.

Bravecto® 112,5/250/500/1000/1400 mg Lösung zum Auftropfen auf die Haut für sehr kleine/kleine/mittelgroße/große/sehr große Hunde. **Wirkstoff:** Fluralaner. **Wirkstoffgruppe:** Ektoparasitika zur systemischen Anwendung. **Zusammensetzung:** 1ml enthält 280 mg Fluralaner. 1 Pipette enthält 112,5/250/500/1000/1400 mg Fluralaner. Sonstige Bestandteile: Dimethylacetamid, Tetraglycol, Diethyltoluamid, Aceton. **Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung eines Zecken- und Flohbefalls bei Hunden. Dieses Tierarzneimittel ist ein systemisches Insektizid und Akarizid und bietet eine sofortige und anhaltende abtötende Wirkung gegen Flöhe (*Ctenocephalides felis* und *Ctenocephalides canis*) über 12 Wochen und eine sofortige und anhaltende Zecken-abtötende Wirkung (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus* und *Dermacentor reticulatus*) über 12 Wochen. Flöhe und Zecken müssen am Wirt anheften und mit der Nahrungsaufnahme beginnen, um dem Wirkstoff ausgesetzt zu werden. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie gegen die allergische Flohdermatitis (FAD) eingesetzt werden. Zur Behandlung der durch *Demodex canis* verursachten Demodikose. Zur Behandlung eines *Sarcoptes*-Räude (*Sarcoptes scabiei* var. *canis*) Befalls. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Milde und vorübergehende Hautreaktionen wie Rötungen oder Haarausfall an der Applikationsstelle, wurden häufig in klinischen Studien beobachtet (bei 1,2 % der behandelten Hunde). Erbrechen, Lethargie und Anorexie wurden sehr selten in Spontanmeldungen nach der Anwendung dieses Tierarzneimittels berichtet. **Warnhinweise:** Bewahren Sie das Tierarzneimittel bis zur Anwendung in der Originalverpackung auf, um Kindern den direkten Zugriff zu verwehren. Kontakt mit Haut, Mund und/oder Augen vermeiden. Die Applikationsstelle nicht berühren, bis sie nicht mehr erkennbar ist. Beim Umgang und der Anwendung dieses Tierarzneimittels Handschuhe tragen. Für die vollständigen Informationen zur Anwendersicherheit Packungsbeilage lesen. **Handelsformen:** Schachtel mit Ein-Dosen-Pipette und ein Paar Handschuhe.

DE: Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Intervet Deutschland GmbH, Feldstraße 1a, D-85716 Unterschleißheim. www.msd-tiergesundheits.de. **AT: Rezept- und apothekenpflichtig. Weitere Angaben zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und zu den besonderen Warnhinweisen zur sicheren Anwendung sind der „Austria-Codex-Fachinformation“ zu entnehmen. Pharmazeutischer Unternehmer:** Intervet GesmbH, Siemensstraße 107, A-1210 Wien. www.msd-tiergesundheits.at.

Urheberrechtlich geschützt © 2022 Intervet International B.V., ein Tochterunternehmen der Merck & Co, Inc., Kenilworth, NJ, USA. Alle Rechte vorbehalten.

Die Wissenschaft für gesündere Tiere

Intervet Deutschland GmbH – ein Unternehmen der MSD Tiergesundheit
Intervet Deutschland GmbH | Feldstraße 1a | D-85716 Unterschleißheim | www.msd-tiergesundheits.de
Intervet GesmbH | Siemensstraße 107 | A-1210 Wien | www.msd-tiergesundheits.at

