

HUSTENFREI DURCHSCHLAFEN

Impfen gegen
Bordetella bronchiseptica (Bb)



Nobivac® Respira Bb

JETZT in der praktischen Fertigspritze



MEHR. WERT.
PRÄVENTION.

Haupterreger CIRB

BORDETELLA BRONCHISEPTICA

78,7%


B. bronchiseptica ist in 78,7 % der Patienten mit akuten respiratorischen Symptomen der primär beteiligte Erreger

B. bronchiseptica ist mehr als doppelt so häufig der Auslöser für akute respiratorische Erkrankungen als das **canine Parainfluenzavirus**¹

Schutzwirkung

nach Belastungsinfektion mit *Bordetella bronchiseptica* zwei Wochen nach Grundimmunisierung.²

Signifikant weniger klinische Anzeichen von Atemwegserkrankungen



Weitgehende Vermeidung von Husten



NOBIVAC® HUSTENIMPFFSTOFFE

Flexibilität für Sie, Hund und Halter

Mit Nobivac® schützen Sie Hunde aller Größen vor Husten.

Nicht abgebildet: die jährliche intranasale Nobivac® BbPi Impfung. Die Kreise im Impfschema entsprechen den Farben der Fläschchenkappen.

	1. IMPFUNG	2. IMPFUNG (-4 Wochen später)	ERSTER JÄHRLICHER BOOSTER ^A	2. JAHR	3. JAHR	4. JAHR	5. JAHR
Nobivac® SHP Nobivac® SHPPi	Orange	Orange	Blau			Blau	
Nobivac® L4	Gelb	Gelb	Gelb	Gelb	Gelb	Gelb	Gelb
Nobivac® Pi				Blau/Weiß	Blau/Weiß		Blau/Weiß
Nobivac® BbPi Nobivac® Respira Bb	Blau ^B		Blau	Blau	Blau	Blau	Blau

	1. IMPFUNG	2. IMPFUNG (-4 Wochen später)	ERSTER BOOSTER ^A	2. JAHR	3. JAHR	4. JAHR	5. JAHR
Nobivac® SHPPi	Blau	Blau	Blau (12 Monate später)			Blau	
Nobivac® L4	Gelb	Gelb	Gelb (12 Monate später)	Gelb	Gelb	Gelb	Gelb
Nobivac® Pi				Blau/Weiß	Blau/Weiß		Blau/Weiß
Nobivac® Respira Bb	Blau ^C	Blau	Blau (7-12 Monate später)	Blau	Blau	Blau	Blau

IMPFSHEMA 1

Vorimpfung mit Nobivac® BbPi, dann Wechsel zu Nobivac® Respira Bb

A Der erste jährliche Booster nach weiteren 12 Monaten für S,H und P wird national von der StlKo Vet und auch international von der WSAVA empfohlen. Er reicht über die Zulassung der S, H und P enthaltenden Nobivac®-Impfstoffe hinaus, die eine Wiederholungsimpfung nach 3 Jahren vorsieht.


B Nobivac® BbPi kann ab einem Alter von 3 Wochen angewendet werden. Eine einmalige Impfung schützt dabei für ein Jahr. Bei einer Vorimpfung mit Nobivac® BbPi kann Nobivac® Respira Bb anschließend 1x jährlich geimpft werden.

IMPFSHEMA 2

Beginn mit Nobivac® Respira Bb

C Nobivac® Respira Bb kann bereits ab einem Alter von 6 Wochen geimpft werden. Eine einfache Impfung 7 Monate nach der Grundimmunisierung mit Nobivac® Respira Bb ist ausreichend, um den Schutz gegen Bb für ein weiteres Jahr aufrecht zu erhalten. Danach sollte die Impfung jährlich erfolgen. Sollte die Auffrischung nach 7 Monaten versäumt werden, ist eine einfache Impfung 12 Monate nach der Grundimmunisierung ausreichend, um den Schutz gegen Bb für ein weiteres Jahr zu verlängern.


Nobivac® Respira Bb



SUBUNIT-IMPfstoff
Basierend auf Fimbrien-Antigen



1 JAHR SCHUTZ
Bei Vorimpfung mit Nobivac® BbPi oder nach
Wiederholungsimpfung mit Nobivac® Respira Bb



EINFACHE HANDHABUNG
Gebrauchsfertig und zeitsparend



NACHGEWIESENE SICHERHEIT
Auch bei kleinen Hunderassen³

Weitere Produkt-
informationen finden Sie hier:

Nobivac® Respira Bb
verschreibungspflichtig



JETZT
5 x 1 Fertigspritzen

Nobivac® 
Protection unites us.

¹ Schulz et al.: Detection of respiratory viruses and Bordetella bronchiseptica in dogs with acute respiratory tract infections, The Veterinary Journal 201, 2014 ² MSD Interne Studie 0031-16 ³ Interne Studie Nobivac® Respira Bb S15007

Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Die Wissenschaft für gesündere Tiere
Intervet Deutschland GmbH • Feldstraße 1a • D-85716 Unterschleißheim • www.msd-tiergesundheit.de
Intervet GesmbH • Siemensstraße 107 • A-1210 Wien • www.msd-tiergesundheit.at

 **MSD**
Tiergesundheit